

## PROTOCOLLO SALUTE PER NIDI E SCUOLE INFANZIA

### INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI:

1. **FEBBRE:** il bambino deve essere rimandato a casa in caso di temperatura > o uguale a 38 °. Dopo lo sfebbramento deve rimanere a casa minimo 36 ore, consigliabile 48 ore, per essere certi della guarigione. Si consiglia di non condurre il bimbo/a al nido /scuola materna se si è somministrato "Tachipirina" o "Nurofen" a casa per rialzo termico anche moderato. La febbre si misura ascellare e si riferisce così come si rileva senza togliere né aggiungere il famoso "mezzo grado".
2. **DIARREA:** il bambino deve essere rimandato a casa nel caso avesse almeno tre scariche liquide. Può ritornare all'asilo dopo almeno 36-48 ore di fuci non più diarreiche. Non occorre seguire una dieta "in bianco", si consiglia rialimentazione leggera ma libera
3. **VOMITO:** il bambino che vomita per più di tre volte dovrà essere rimandato a casa. Può riprendere a frequentare dopo 36-48 ore senza sintomi di vomito e se, in contemporanea, non fossero subentrati sintomi di enterite. Durante le prime ore di vomito **NON SOMMINISTRARE CIBO** ma SOLO ACQUA MOLTO FREDDA O CON GHIACCIO a cucchiaini
4. **CANDIDOSI SIA ORALE CHE GENITALE, AFTA O STOMATITE:** il bambino non può frequentare sino a guarigione
5. **ESANTEMI VIRALI COME MANO/BOCCA/PIEDI:** almeno 4 giorni a casa sin tanto che le pustole non saranno secche.
6. **CONGIUNTIVITE:** il bambino non può frequentare e la malattia deve essere trattata farmacologicamente. La ripresa della frequenza è subordinata alla risoluzione della sintomatologia e devono trascorrere almeno 48 ore dall'inizio della terapia.
7. **LENDINI O PIDOCCHI:** occorre fare almeno un trattamento e verificare che non ci siano più i parassiti ai capelli (usare il pettinino) prima del rientro in collettività. Il trattamento andrà ripetuto una seconda volta a distanza di una settimana. E' comunque opportuno che durante le ore di permanenza all'asilo i capelli lunghi siano legati.
8. **"MOCCIO AL NASO":** il bambino può frequentare. Si consiglia un controllo pediatrico qualora la secrezione nasale diventasse purulenta.
9. **"MAL DI GOLA":** se la sintomatologia è importante far visitare il bambino per escludere lo streptococco. Se il bambino avesse anche la febbre le norme di comportamento sono quelle riportate al punto 1.
10. **"MALANNI DA DENTIZIONE:** non è scientificamente dimostrato che la dentizione favorisca le malattie. Può rendere il bambino facilmente irritabile.
11. **EOSINA** non è un farmaco e può essere utilizzata nei nidi in caso di necessità.

12. TRAUMI in generale agli arti utilizzare arnica e o ghiaccio.

Per il trauma cranico ghiaccio.

In entrambi i casi avvisare la famiglia del bambino. In caso di fratture e conseguente ingessatura è sconsigliata la frequenza.

Mondovì, 28/08/2025

**Dott.ssa Patrizia Fusco  
Direttore SC pediatria Mondovì**

Città di Mondovì  
Registro Protocollo  
Numero 0037238  
Data 04/09/2025